

Phá thai 3 tháng đầu với kháng sinh (Mifepristone và Misoprostol)

Phá thai 3 tháng đầu với thuốc kháng sinh là có khả năng, trường hợp bạn được thực hiện tại [phá thai ở đâu an toàn](#), mặt khác có sự giám sát y tế từ các bác sĩ chuyên môn. Tuyệt đối không tự tiện dùng kháng sinh phá thai tại nhà, bởi nó có khả năng dẫn đến rất nhiều lần biến chứng nguy hiểm tới tính mạng, có khi còn là tử vong.

Bỏ thai ba tháng đầu với kháng sinh được làm theo cho ai?

Giải pháp này được làm cho những phụ nữ:

- Mang thai 7 tuần tuổi trở xuống (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng).
- Muốn chấm dứt thai nghén.

Phương pháp này có an toàn và lợi ích tốt không ?

- Phá thai với thuốc là giải pháp sử dụng kháng sinh để chấm dứt thai nghén một giải pháp sử dụng các biện pháp an toàn và tin cậy.
- Cách này sử dụng các biện pháp an toàn lúc người chế tạo dịch vụ là những cán bộ y tế từng được đào tạo và có đủ kỹ năng thực hành giải pháp bỏ thai này.
- Phá thai với thuốc có hiệu quả đến 96-99%.

Biện pháp này xảy ra thay thế nào?

- Nhân viên y tế sẽ thực hiện thăm khám khung chậu.
- Nhân viên y tế sẽ hỏi bạn một số thắc mắc về sức khỏe của bạn, tư vấn về liệu trình phá thai và giải đáp giúp bạn về những cách tránh thai.
- Bạn nên ký tới một bản cam kết bỏ thai.

- Dưới đây nhân viên y tế sẽ đưa giúp bạn 1 viên kháng sinh tên Mifepristone (Mifestad®200) để uống tại Cơ sở. Mifepristone (Mifestad®200) sẽ làm theo thai bạn dừng phát triển.
- Có khả năng bạn sẽ cảm giác vẫn bình thường sau thời gian áp dụng viên kháng sinh này song cũng có thể thấy xuất máu vùng kín.
- Bạn sẽ về nhà sau thời điểm lấy viên thuốc kháng sinh này.
- Bạn sẽ áp dụng cái thuốc kháng sinh tiếp theo là Misoprostol: sử dụng 2 viên Misoprostol sau thời điểm sử dụng Mifepristone 2 ngày. Bạn có thể quay lại trung tâm y tế để áp dụng Misoprostol.
- Thông thường tầm 30 phút tới 4 giờ dưới khi lấy Misoprostol, bạn sẽ đau đớn bụng, ra máu nhiều lần và ra máu u khi thai được tống ra Ngoài.
- Hầu hết con gái xuất máu ví dụ có kinh tầm 10 ngày để cập từ thời điểm dùng thuốc kháng sinh, tuy nhiên một vài ít chị em có khả năng chảy máu nhẹ cải thiện hơn 1 tháng.

Có tác dụng phụ không giống không?

Bạn có khả năng thấy buồn nôn, tiêu xuất hay nôn mửa trong liệu trình sảy thai. Các dấu hiệu này dẫn tới không dễ bạn nhưng không phải là câu hỏi bất luôn và sẽ qua đi trong thời gian ngắn, không nên trị nhất là gì.

Bạn sẽ được kê đơn thuốc giảm sút đau, ví dụ Paracetamol hay Ibuprofen để suy yếu cơn đau bụng.

Bạn cũng có thể dùng chai nước nóng hoặc khăn ấm để chườm bụng.

Bạn có thể bắt gặp đau đớn đầu và chóng mặt sau lúc sử dụng Misoprostol. Hãy lấy nhiều nước hoặc nước hoa quả - Không dùng cà phê hoặc rượu và dùng thuốc kháng sinh suy yếu đau đớn nếu cần.

Một số bạn gái bị sốt trong vài giờ, đôi khi đi kèm ớn lạnh. Biểu hiện này sẽ tức thì qua đi và không nguy hại.

>>> Nghiên cứu thêm: [thuốc phá thai](#)

Cháu cần tuân thủ gì khi làm biện pháp này?

- Thay thế băng vệ sinh luôn đó là trong kỳ kinh bình thường giúp đến khi hết ra máu.
- Bạn có khả năng tắm bình thường.

- Bạn không nên ăn kiêng bất cứ loại thực phẩm nào.

Ví như giải pháp này thất bại thì sao?

Đứa con có khả năng bị khuyết tật nếu bào thai tiếp tục phát triển. Bởi vậy, khi bạn đã sử dụng Mifepristone, bạn không thể duy trì được thai nữa.

Ví như phá thai bằng kháng sinh thất bại, cần tiến hành nạo phá thai.

Có khả năng diễn ra biến chứng không?

Phá thai ba tháng đầu với thuốc là phẫu thuật sử dụng các biện pháp an toàn hơn rất nhiều lần so với biện pháp nạo với thìa, tuy vậy vẫn có một số trường hợp không to các biến chứng có khả năng xảy ra.

Những tai biến nào có thể xảy ra?

Rất ít khi người mua gặp tai biến và hậu quả như:

- Xuất huyết quá nhiều lần cần nạo hút phá thai với giải pháp hút chân không.
- Viêm cần phải dùng thuốc kháng sinh.
- Chảy huyết quá rất nhiều lần gây nên mệt mỏi hoặc chóng mặt, nên tiếp máu.

Thời gian nào tôi cần phải quay lại Khu vực y tế?

Trường hợp bạn thấy:

Đau đớn bụng luôn sau thời kỳ chảy huyết đầu tiên.

Chảy huyết vùng kín quá nhiều(mỗi giờ thấm hết 2 băng rửa ráy dày trong 2 giờ liền).

Sốt 38 độ C trở tới và kéo dài Trên 1 ngày dưới lúc lấy Misoprostol.

Không ra huyết trong vòng 24 giờ sau lúc áp dụng thuốc kháng sinh Misoprostol.

(Chú ý: có thể xuất máu kéo dài trong vài tuần tuy nhiên bắt buộc giảm dần về lượng)

Quay lại thăm khám thăm khám tầm khoảng 2 tuần để khẳng định đã từng sảy thai hoàn toàn. Lần tái khám này là rất quan trọng.

Tôi buộc phải tuân thủ gì để giảm thiểu có thai Cùng với ý muốn?

Biện pháp bỏ thai với kháng sinh sẽ chấm dứt thai nghén lần này nhưng bạn có thể mang bầu khoảng 2 tuần sau đó trường hợp có giao hợp và không dùng cách tránh thai. Vì vậy, bạn cần dùng 1 giải pháp ngừa thai tiên tiến để giảm thiểu mang thai Bên cạnh ý muốn.

Những cách tránh thai hiện giờ nào là phổ biến?

Nhân viên y tế sẽ cung cấp kiến thức, giúp bạn chọn chọn và hướng dẫn bạn cách dùng 1 biện pháp ngừa thai hợp lý.

- [Bị đau tinh hoàn khám ở đâu tốt uy tín tại Hà Nội - 8 địa chỉ](#)
- [Tổng đài bác sĩ tư vấn sức khỏe sinh sản online cho phụ nữ](#)
- [Chi phí nạo hút thai hết bao nhiêu tiền, hút thai ở đâu không đau?](#)
- [Top 4 cách chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung tốt tại Hà Nội](#)
- [Top 6 địa chỉ phòng khám, bệnh viện khám chữa hiếm muộn tốt nhất Hà Nội](#)
- [Cập nhật bảng giá chi phí phẫu thuật cắt bao quy đầu ở Hà Nội bao nhiêu tiền](#)
- [Top 8 địa chỉ bệnh viện, phòng khám phẫu thuật cắt bao quy đầu tốt uy tín ở Hà Nội](#)
- [Top 9 địa chỉ khám chữa bệnh lậu ở đâu tốt uy tín tại Hà Nội](#)
- [Top các nguyên nhân chậm kinh mà không có thai](#)
- [Bác sĩ tư vấn có thai 4 tuần có phá được không](#)